УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ Е.А. Непоклонов
29 ИЮЛ 2012

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Максуса G100 для лечения энтеритов бактериальной этиологии у свиней, бройлеров и ремонтного молодняка кур

(организация-разработчик: «Eli Lilly and Company», США)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Максус G100 (Maxus® G100).

Международное непатентованное наименование: авиламицин.

2. Лекарственная форма: гранулированный порошок для орального применения.

Максус G100 в качестве действующего вещества в 1 кг содержит авиламицин - 100 г, а также вспомогательные вещества: минеральное масло – 28-30 г, жмых соевых бобов - до 1 кг.

3. Максус G100 выпускают расфасованным по 25 кг в многослойные бумажные пакеты.

4. Максус G100 хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

Срок годности Максуса G100 при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Лекарственный препарат в смеси с кормом можно хранить в течение 3 месяцев при температуре хранения не выше 25°С.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

5. Максус G100 хранят в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат должен уничтожаться в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Максус G100 - антибактериальный препарат группы олигосахаридов.

Авиламицин – действующее вещество препарата – активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе в отношении Clostridium perfringens и Escherichia coli. Механизм действия авиламицина заключается в подавлении синтеза белка в микробной клетке на рибосомальном уровне.

Авиламицин после орального применения всасывается в желудочно-кишечном тракте в незначительной степени и практически не накапливается в органах и тканях, выводится из организма в неизмененной форме преимущественно с фекалиями.

По степени воздействия на организм Максус G100 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Максус G100 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям, бройлерам и ремонтному молодняку кур-несушек до 16-недельного возраста при энтеритах бактериальной этиологии, вызываемых Clostridium perfringens (некротический энтерит) и другими чувствительными к авиламицину микроорганизмами.

9. Запрещается применение Максуса G100 в случае повышенной индивидуальной чувствительности к авиламицину, а также курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста.

10. Максус G100 применяют в смеси с кормом:

- свиньям – начиная с 3-недельного возраста в дозе 0,5 кг на 1 тонну корма (50 г авиламицина на тонну корма) в течение 10 суток;
- бройлерам и ремонтному молодняку кур – в дозе 0,3 кг на 1 тонну корма (30 г авиламицина на 1 тонну корма) в течение 10 суток. Лечение ремонтного молодняка кур-несушек, при необходимости, повторяют перед перемещением птиц в птичники в той же дозе в течение 5-7 суток.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу Максуса G100, рассчитанную на определенное поголовье, смешивают с небольшим количеством корма (20-50 кг), затем с большим количеством корма (100 кг) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в конечный объем корма.

11. Симптомы передозировки при применении Максуса G100 у свиней и птиц не установлены.

12. Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо возобновить применение препарата в той же дозе и по той же схеме.

14. При применении Максуса G100 согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

15. Максус G100 совместим со всеми известными лекарственными препаратами и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве и свиноводстве. Не рекомендуется одновременное назначение препарата с бактерицидными антибиотиками.

16. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки, а свиней – через 2 суток после последнего применения препарата. Мясо свиней и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

17. При применении Максуса G100 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «Eli Lilly and Company Limited, Speke Operations», Fleming Road, Speke, Liverpool L24 9LN, UK (Великобритания).

Инструкция по применению разработана компанией «Eli Lilly Regional Operations Ges.m.b.H.», Kolblgasse 8-10, A-1030 Wien, Austria (Австрия).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Максуса G100 , утвержденная Россельхознадзором от 24 февраля 2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения