



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Актисаф Sc 47 Нг+ для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и увеличения привесов сельскохозяйственных животных и птицы

(организация-производитель фирма "S.I. Lesaffre"/ "С.И. Лесаффр", Франция)

### I. Общие сведения

1. Актисаф Sc 47 Нг+ (Actisaf Sc 47 Нг+) – добавка кормовая для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и увеличения привесов сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Актисаф Sc 47 Нг+ представляет собой высушенную культуру живых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (штамм NCYC Sc 47). В 1 г Актисаф Sc 47 Нг+ содержится не менее  $1,0 \times 10^{10}$  КОЕ (колониеобразующих единиц) *Saccharomyces cerevisiae*.

Актисаф Sc 47 Нг+ не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. По внешнему виду Актисаф Sc 47 Нг+ представляет собой микрогранулированный порошок бежевого цвета со слабым запахом дрожжей.

4. Актисаф Sc 47 Нг+ выпускают расфасованным по 25 кг в полиэтиленовых мешках. Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием на русском языке: наименования организации–производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, срока и условий хранения, даты изготовления, номера партии, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

5. Актисаф Sc 47 Нг+ хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0 °С до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Актисаф Sc 47 Нг+ запрещается использовать по истечении срока годности.

### II. Биологические свойства

6. Дрожжи стимулируют в кишечнике рост полезной микрофлоры и активизируют процессы пищеварения, и тем самым способствуют более полному извлечению питательных веществ из корма у животных и благоприятно влияют на обмен веществ в организме. Актисаф Sc 47 Нг+ повышает сохранность животных, их продуктивность, предотвращает возникновение у животных диареи, а у жвачных животных развитие ацидоза в рубце.

### III. Порядок применения

7. Актисаф Sc 47 Нг+ предназначен для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности, увеличения привесов и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

8. Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> применяют индивидуально или групповым методом в составе премиксов, комбикормов, кормовых смесей, минерально-витаминных добавок, заменителей цельного молока. При внесении Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> в комбикорма, концентраты, витаминно-минеральные добавки и заменители молока на комбикормовых, премиксных заводах или в кормоцехах хозяйств используют соответствующие технологии смешивания и оборудование, обеспечивающее равномерное смешивание кормовой добавки с комбикормом.

Норма ввода из расчета на тонну корма:

Свиноматкам	250-1000 г/т корма
Свиньям	125-1000 г/т корма
Кроликам	250-1000 г/т корма
Курам-несушкам	250-2000 г/т корма
Бройлерам	250-2000 г/т корма
Поросятам	250-1000 г/т корма
Телятам на откорме (0-4 мес.)	250-1000 г/т корма

Норма ввода индивидуально, г/голову:

Крупный рогатый скот мясных пород на откорме	2-6 г/день/голову
Коровы молочных пород	2-8 г/день/голову
Бараны, козы, овцы	0,5-2 г/день/голову
Лошади	4-10 г/день/голову

Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> рекомендуется применять на протяжении всего продуктивного периода животных и птицы.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

11. Противопоказаний к применению не установлено.

12. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> можно использовать в пищевых целях без ограничения.

#### IV. Меры личной профилактики

13. При работе с кормовой добавкой Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

14. Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup> следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «САФ-НЕВА» (г. Воронеж) совместно с компанией «S.I. Lesaffre» Франция.

Адрес организации-производителя: «S.I. Lesaffre»/ «С.И. Лесаффр» (Франция), 137, rue Gabriel Peri, 59703, Marcq en Baroeul, France.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Актисаф Sc 47 Нг<sup>+</sup>, утвержденная Россельхознадзором 11 июля 2014 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-5.14/04302