

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% с лечебной и лечебно-профилактической целью при болезнях бактериальной этиологии у свиней и сельскохозяйственных птиц.

(Организация-разработчик: «ANDRES PINTALUBA S.A.», Pol. Ind. Agro-Reus, Prudenci Bertrana str., 5/E-43206 Reus, Spain / «АНДРЕС ПИНТАЛУБА С.А.», Индустриальный Полигон Агро-Реус, ул. Пруденси Бертрана, 5/Е-43206, Реус, Испания)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% (APSAMIX TIAMULIN 10%).

Международное непатентованное наименование: тиамулин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% в качестве действующего вещества содержит тиамулин (в форме гидроген фумарата) - 100 мг/г, а в качестве вспомогательных веществ: лактозу моногидрат, каррагенан, сорбиновую кислоту, легкое вазелиновое масло, коллоидный диоксид кремния и кальция карбонат до 1 г.

3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулы от белого до светло-кремового цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки - 28 дней. Срок хранения корма после добавления в него лекарственного препарата - 3 месяца.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% расфасованным по 25 кг в полимерные герметично запаянные многослойные мешки, которые снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% в закрытой упаковке производителя в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

6. АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% относится к антибактериальным препаратам группы плевромутилинов.

10. Тиамулин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и микоплазм, в т.ч. *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Listeria spp.*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Actinobacillus spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides spp.*, *Campylobacter spp.*, *Lawsonia intracellularis*, *Brachyspira spp.*, *Mycoplasma spp.*

В основе механизма действия тиамулина лежит его способность связываться с 50S субъединицей рибосом бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белка и гибели микроорганизма. Действует бактериостатически.

После перорального введения тиамулин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, проникает в большинство органов и тканей, достигая максимальных концентраций через 2-4 часа после введения. Терапевтические концентрации в крови и тканях организма животных сохраняются в течение 18-24 часов. Метаболизируется в печени. Выводится, в основном с фекалиями - до 70%, около 30% с мочой.

По степени воздействия на организм АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% относится к группе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не вызывает побочных явлений и осложнений.

## III. Порядок применения

11. АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% назначают свиньям, цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста и птице родительского стада с лечебной и лечебно-профилактической целью при желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тиамулину, в том числе при дизентерии и энзоотической пневмонии (микоплазмозе) свиней и микоплазмозе птиц.

12. Противопоказанием к применению АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение лекарственного препарата птице, яйца которой используют в пищевых целях, и ремонтному молодняку кур менее, чем за 2 недели до начала яйцекладки.

13. АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% назначают в смеси с кормом, индивидуально или групповым способом, в течение 3-5 суток:

- свиньям в суточной дозе 10 мг тиамулина на 1 кг массы животного (что соответствует 100 мг препарата на 1 кг массы животного).

- цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста и птице родительского стада в суточной дозе 25 мг тиамулина на 1 кг массы птицы (что соответствует 250 мг препарата на 1 кг массы птицы).

Для обеспечения более точной суточной дозы препарата, норму его введения в корм требуется корректировать в зависимости от реально

потребляемого количества корма в сутки, точной массы животного или птицы, с учетом физиологического, клинического состояния, а также времени года.

Для обеспечения равномерного распределения, рассчитанную суточную дозу лекарственного препарата последовательно смешивают с кормом и дают свиньям и птице в два приема с интервалом в 12 часов (утром и вечером).

Корм с лекарственным препаратом используется в качестве единственного источника питания в течение всего периода лечения.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата могут проявляться нарушением функций желудочно-кишечного тракта. Эти симптомы не требуют медикаментозного лечения и проходят самостоятельно при отмене препарата.

15. Особенности действия при первом приеме лекарственного препарата или при его отмене не выявлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата свиноматкам в первый месяц супоросности, а также племенным хрякам.

17. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозах и по той же схеме лечения.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные лекарственные средства и симптоматическую терапию.

19. АПСАМИКС ТИАМУЛИН 10% не следует применять одновременно с макролидами и аминогликозидами, так как они снижают антибактериальную активность препарата. Запрещается применение лекарственного препарата по крайней мере, за 7 дней до и 7 дней после применения кокцидиостатиков, содержащих монензин, салиномицин, наразин и другие ионофорные антибиотики, так как возможно усиление гепатоксического эффекта.

20. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток, птицы - не ранее, чем через 3 суток после последнего применения препарата.

В случае вынужденного убоя животных и птиц ранее установленного срока, мясо можно использовать в корм плотоядным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Все работы с лекарственным препаратом необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы

следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. У гиперчувствительных людей возможен контактный дерматит.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

«ANDRES PINTALUBA S.A.», Pol.  
Ind. Agro-Reus, Prudenci Bertrana str.,  
5/E-43206 Reus (Spain) / «АНДРЕС  
ПИНТАЛУБА С.А.»  
Индустриальный Полигон Агро-Реус,  
ул. Пруденси Бертрана, 5/Е-43206,  
Реус (Испания)

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий  
от потребителя.

ООО «Юг-Биосфера», 350059, г.  
Краснодар, ул. Онежская, 37.

Номер регистрационного удостоверения 724-3-8.17-3809 №ПВИ-3-8.17/05025