

НАСТАВЛЕНИЕ по применению препарата «Тилозина тартрат» (для ветеринарного применения)

1. Общая часть

Торговое название: Тилозина тартрат

Состав: Тилозина тартрат..... 100 г (активное вещество)

Описание : Однородный порошок от белого до светло -желтоватого цвета

Лекарственная форма: порошок , для приготовления раствора

Растворимость: Легко растворяется в воде

Тилозин представляет собой антибиотик, вырабатываемый штаммом *Streptomycesfradiae*, и он является актиномицетом. Тилозин связывается с рибосомой 50S и ингибирует синтез белков. Он является бактериостатическим антибиотиком. Спектр антибактериального действия тилозина охватывает, в основном, грамположительные микроорганизмы (виды *Staphylococcus*, виды *Streptococcus*, виды *Clostridium*), но он также активен и против некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Было обнаружено, что он также активен против видов *Mycoplasma*.

2. Показания к применению:

Куры:

Лечение хронического респираторного заболевания (ХРЗ), вызванного *Mycoplasmagallisepticum*, чувствительными к действию тилозина, у бройлеров и цыплят для восполнения поголовья.

Индейки:

Лечение инфекционного синусита, вызванного *Mycoplasmagallisepticum*, чувствительными к действию тилозина.

Свиньи:

Лечение дизентерии свиней, вызванной *Serpulinahyodseteriae* или другими патогенными микроорганизмами, чувствительными к действию тилозина.

Целевые виды животных: Куры, индейки, свиньи.

Порядок и доза применения:

Куры и индейки:

Для приготовления раствора, содержащего 2 г/4 л (500 мг/л), перемешивают 100 г тилозинатартрата вместе с 200 литрами.

Свиньи:

Для приготовления раствора, содержащего 1 г/4 л (250 мг/л), перемешивают 100 г тилозинатартрата вместе с 400 литрами.

Продолжительность лечения:

Куры и индейки:

Лечение – вместе с питьевой водой в течение 3 дней в дозе 2 г/4 л (500 мг/л) или в течение 1 - 5 дней в зависимости от тяжести инфекции.

Свиньи:



Лечение – вместе с питьевой водой в течение 3 - 10 дней в дозе 1 г/4 л (250 мг/л).
При всех видах патогенных микроорганизмов, если улучшение не наблюдается в течение 5 дней, необходимо повторно подтвердить диагноз.

Особые указания:

1. Необходимо всегда добавлять воду в порошок.
2. Нельзя насыпать порошок в воду.
3. Необходимо приготавливать свежий раствор каждые 3 дня.
4. При перемешивании тилозина и выполнении других операций по обращению с ним, необходимо использовать защитную одежду и непроницаемые перчатки.
5. Вода, содержащая лекарственное средство, должна быть единственным источником питьевой воды в период лечения.
6. Нельзя применять препарат у птиц-несушек.

Период выведения препарата из организма: мясо

Куры: 2 дня

Индейки: 5 дней

Свиньи: 2 дня.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 30°C

Хранить в недоступном для детей месте.

Препарат необходимо использовать сразу же после его разбавления.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска / упаковка: Банка из полиэтилена высокой плотности, в которую уложен пакет из полиэтилена низкой плотности, содержащий 100 г, 200 г, 500 г и 1000 г- порошка, снабженная этикеткой, к которой приложена инструкция-вкладыш по медицинскому применению лекарственного средства.

Изготовитель гарантирует требуемую активность препаратов в течение 36 месяцев со дня их изготовления при соблюдении потребителем правил хранения и использования .

Наименование производителя: Компания: "ADWIA S.A.E CO." ("АДВИА С.А.Е. КО").

Адрес производителя: 10th of Ramadan City, Industrial Area A2, Egypt (10th of Ramadan City, ИндустриалЭйреа А2, Египет).





المحافظة الصناعية الأولى - مدينة العبور - ص - ب ، 09 - العبور - القاهرة - ج.م.ع - سجل تجاري رقم 29-222 ت : 2222-210 فاكس : 210-001

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A2 تليفون : 2015413104 فاكس : 2015413107

Head Office : 1st Indust. Area, El-Obour City - P.O.Box: 59 El Obour - Cairo - Egypt. Tel.: (202) 46104444 Fax: (202) 46100851 Web:www.adwia.com
Factory : 10th of Ramadan City, Indust. Area A2 - Tel.: (2015) 413104, Fax: (2015) 413107, E-mail:adwia@adwia.com



ISO 9001 Certificate No. : 1128
ISO 14001 Certificate No. : 1128